


geboortegewicht
1500 - 1999 gram

naam.....
gestateduur.....
patientnummer.....

geboortedatum.....
geboortetijdstip.....
geboortegewicht



Richtlijn voor het gebruik van fotherapie en wisseltransfusies gebaseerd op TSB (µmol/l)

<ol style="list-style-type: none"> Kruis risicostatus aan (standard risk of high risk) Zet TSB in de curve Start fotherapie als FT-grens overschreden is. Fotherapie kan gestopt worden als TSB onder de FT-grens is. Overweeg wisseltransfusie als WT-grens overschreden is, ondanks intensieve fotherapie. 	<p>High risk factoren (dagelijks te bepalen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - asfyxie: apgar score < 3 na 5 min. - hypoxemie: PaO₂ < 5.3 kPa > 2 uur (recente 24 u) - acidosis: pH < 7.15 > 1 uur (recente 24 u) - hemolysis met positieve coombs - klinische of neurologische verslechtering zoals sepsis waarvoor vasopressoren, meningitis, intracraniele bloeding > gr 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gebaseerd op richtlijnen gepubliceerd door Ahlfors 1994 en Maisels 2003